


## Qu'est-ce que la rupture utérine ?

La rupture utérine est une **complication obstétricale peu fréquente mais grave**, caractérisée par la déchirure de la paroi utérine pendant la grossesse ou le travail.


Elle peut affecter à la fois la mère et le bébé et nécessite **une intervention médicale urgente**.

## Suis-je à risque ?


La rupture utérine est rare, mais certains **facteurs peuvent augmenter** le risque :




Cicatrice  
césarienne



Fibrome retiré  
par myomectomie



Chirurgie  
hystéroscopique



Anomalies  
mullériennes



Déclenchement ou  
augmentation du travail

## Signes & Symptômes :

Reconnaître les signes précoces d'une rupture utérine est essentiel pour prévenir des issues potentiellement mortelles pour le bébé, voire pour la mère.

De nombreuses femmes rapportent que leurs symptômes étaient **subtils, rejetés ou mal interprétés**.

Cette page regroupe les **symptômes connus** décrits dans la littérature clinique et ceux répétés dans les témoignages de patientes.



Douleurs  
soudaines



Pression  
intense



Douleurs  
épaules



Contraction  
permanente



Saignement  
vaginal



Nausées  
Vomissement



Vertiges et  
malaise



Fièvre  
Chaud / Froid



Sentiment  
de danger

Les symptômes peuvent aussi être subtils, atypiques ou se développer progressivement plutôt que soudainement. Les signes énumérés ici représentent les caractéristiques les plus couramment signalées, mais ils ne sont pas exhaustifs et leur absence n'exclut pas une rupture.

## En cas de doute ou d'apparition de signes :

La rupture utérine est une **urgence absolue** qui nécessite une intervention chirurgicale immédiate.

En cas de symptômes ou de doute, **rendez-vous en urgence dans la maternité la plus proche** disposant d'un bloc opératoire 24h/24. À délai équivalent, **privilégiez le niveau de maternité le plus élevé**.

Les maternités de **type II ou III** disposent d'**unités de néonatalogie adaptées** pour assurer la prise en charge optimale du nouveau-né en cas de complication.

Rappel des numéros d'urgence :

**15** pour le SAMU.

**18** pour les POMPIERS.

## L'importance de la sensibilisation :


Être sensibilisée à la rupture utérine et avoir une équipe médicale formée permet de **réduire de plus de moitié la morbidité et augmenter les chances de survie de la mère et du bébé**.



Plus d'informations  
sur la rupture utérine :



[www.uterinerupture.org](http://www.uterinerupture.org)  
[@uterinerupture](https://twitter.com/uterinerupture)



**UterineRupture**  
Awareness

# Suis-je à risque ??

Briser le silence  
et éclairer la voie sur  
la rupture utérine.



**UterineRupture**  
Awareness

[uterinerupture.org](http://uterinerupture.org)  
[@uterinerupture](https://twitter.com/uterinerupture)